

ALBANI E RUGGIERI
YOUR PLANTS,
BREEDING
& PRODUCTION



CRISANTEMI

da Vaso



2021

ALBANI VINCENZO E RUGGIERI ITALINA - Società Semplice Agraria
VIA FONTANATETTA 20 BORGO PANTANO SANT'AGOSTINO - 00053 CIVITAVECCHIA (ROMA) ITALY
TELEFONO: +39 (0)766 568401 - FAX: +39 (0)766 560338

www.albani.it - info@albani.it

CRISANTEMI

DA VASO

INDICE

2/5	UNIFLORA FIORE A PALLA
6	MARGHERITE BICOLOR
7	MULTIFLORA FIORE GRANDE
8/13	MULTIFLORA FIORE MEDIO
13	MULTIFLORA FIORE PICCOLO
14	SETTEMBRINI
	INFO & NOTE COLTUR ALI

LEGENDA

LÉGENDE-LEGENDA-LEGEND

Guida al catalogo

SETTIMANE DI REAZIONE

Settimane occorrenti per la fioritura dall'inizio dei giorni corti

REACTION WEEKS

Weeks needed for blooming starting from short-days

SEMAINES DE REACTION

Le nombre des semaines nécessaires pour la floraison à partir des jours courts

SEMANA DE REACCIÒN

Semana necesaria para la florescencia del inicio del dia corto

CRESCITA/GROWING/CROISSANCE CRECIMIENTO:

1: BASSA-LOW-LENTE-BAJO

2: MEDIA-MEDIUM-MOYENNE-MEDIO

3: ALTA-HIGH-ÉLEVÉE-ALTO



TARQUINIA
BIANCO



LADY
VALOR®



TARQUINIA
GIALLO®



TOLERANCE
BLANC®




PASSION
JAUNE®



TOLERANCE
JAUNE®



Fiore a palla




NEW

FLAMICOT®



**LE COLOMBIER
JAUNE**®



**LE COLOMBIER
DORÉ**®



**LE COLOMBIER
ROUGE**®



ANGELYS®



**ANGELYS
JAUNE**®



**DIANA
ORANGE**®



**DIANA
WHITE**®



**DIANA
PINK**®



Fiore a palla



ARBER®



ALBUGO®



BELLATIA®



BILKIS®



TOLFA



VITERBO



ROMY®



SPERLONGA



FRASCATI
ROSA



ROMY
BORDEAUX®



ALLUMIERE



Fiore a palla



CHAMA
ROUGE ®



CHAMA
VIOLET ®



CHAMA
GIALLO ®



TRESCHAUD ®



KANZOU ®




GUEPIER ®




BENEDICTE
ROUE ®



OLEBO ®



KARINE ®
JAUNE - BLANC
ROSE - CUIVRE



FAIBELLE ®



CRISANTEMI MARGHERITE

BICOLOR



**CHARLESTON
ROUGE** ®



**CHARLESTON
ROSE** ®

MARGHERITE BICOLOR

VARIETÀ	BREVETTO	COLORE	TIPO DI FIORE	FORMA PIANTA	PERIODO FIORITURA	ULTIMA CIMATURA	DIMENSIONE PIANTA	ALAR	RESISTENZA RUGGINE
CHARLESTON ROSE	P	bicolore rosa	semplice	eretta	20 OTT	10 AGO	grande	SI	SI
CHARLESTON ROUGE	P	bicolore rosso	semplice	eretta	20 OTT	10 AGO	grande	SI	SI

INFORMAZIONI TECNICHE-VARIETA' & COLORI

UNIFLORA FIORE A PALLA

VARIETÀ	BREVETTO	COLORE	TIPO DI PIANTA	PERIODO FIORITURA	ULTIMA CIMATURA	DIMENSIONE PIANTA	ALAR	RESISTENZA RUGGINE
ANGELEYS	P	bianco	media	15 OTT	30 LUG		NO	SI
ANGELEYS JAUNE	P	giallo chiaro	media	15 OTT	30 LUG		NO	SI
ALBUGO	P	bianco puro	media	30 OTT	15-20 LUG		NO	NO
ALLUMIERE	-	bronzo	media	20 OTT	20-30 LUG		SI	NO
ARBER	P	bianco	media	20 OTT	30 LUG		SI	SI
BELLATIA	P	giallo	media	25 OTT	20 LUG		SI	NO
BENEDICTE ROUGE	P	rosso bronzo	media	25 OTT	20-30 LUG		SI	SI
BILKIS	P	bianco	medio-alta	25 OTT	20-30 LUG		SI	SI
CHAMA GIALLO	P	giallo intenso	medio-bassa	25 OTT	20-30 LUG		NO	NO
CHAMA ROUGE	P	rosso	medio-bassa	25 OTT	20-30 LUG		NO	NO
CHAMA VIOLET	P	viola	medio-bassa	25 OTT	20-30 LUG		NO	NO
DIANA ORANGE	P	arancio	media	15 OTT	30 LUG		NO	SI
DIANA PINK	P	rosa	media	15 OTT	30 LUG		NO	SI
DIANA WHITE	P	bianco	media	15 OTT	30 LUG		NO	SI
FAIBELLE	P	rosa	media	20 OTT	30 LUG		SI	SI
NEW FLAMICOT	P	rosso	media	25 OTT	30 LUG		SI	NO
FRASCATI ROSA	-	rosa chiaro	media	20 OTT	20-30 LUG		SI	NO
GUEPIER	P	giallo intenso	medio-alta	30 OTT	15-20 LUG		SI	NO
KANZOU	P	rosa	medio	20 OTT	30 LUG		SI	NO
KARINE BLANC	P	bianco	medio-bassa	20 OTT	20-30 LUG		SI	SI
KARINE CUIVRE	P	bronzo	medio-bassa	20 OTT	20-30 LUG		SI	SI
KARINE JAUNE	P	giallo	medio-bassa	20 OTT	20-30 LUG		SI	SI
KARINE ROSE	P	rosa	medio-bassa	20 OTT	20-30 LUG		SI	SI
LADY VALOR	P	giallo	medio-bassa	15 OTT	20 LUG		NO	NO
LE COLOMBIER DORÉ	P	bronzo intenso	medio-alta	20 OTT	20-30 LUG		SI	NO
LE COLOMBIER JAUNE	P	giallo	medio-alta	20 OTT	20-30 LUG		SI	NO
LE COLOMBIER ROUGE	P	rosso	medio-alta	20 OTT	20-30 LUG		SI	NO
OLEBO	P	lilla	media	20 OTT	30 LUG		SI	SI
PASSION JAUNE	P	giallo carico	medio-alta	25 OTT	20 LUG		SI	NO
ROMY	P	lilla scuro	media	20 OTT	20-30 LUG		NO	SI
ROMY BORDEAUX	P	rosso	media	20 OTT	20-30 LUG		NO	SI
SPERLONGA	-	rosso	medio-bassa	25 OTT	20-30 LUG		NO	NO
TARQUINIA BIANCO	-	bianco puro	medio-alta	20 OTT	20-30 LUG		SI	SI
TARQUINIA GIALLO	-	giallo oro	medio-alta	20 OTT	20-30 LUG		SI	SI
TOLERANCE BLANC	P	bianco puro	media	20 OTT	15-20 LUG		SI	SI
TOLERANCE JAUNE	P	giallo oro	media	20 OTT	15-20 LUG		SI	SI
TOLFA	-	rosso	medio-alta	20 OTT	20 LUG		SI	SI
TRESCHAUD	P	arancio	medio-bassa	20 OTT	20-30 LUG		SI	NO
VITERBO	-	lilla intenso	medio-alta	25 OTT	20-30 LUG		SI	NO


INFORMAZIONI TECNICHE-VARIETA' & COLORI

MULTIFLORA FIORE GRANDE

VARIETÀ	BREVETTO	COLORE	TIPO DI FIORE	FORMA PIANTA	PERIODO FIORITURA	ULTIMA CIMATURA	DIMENSIONE PIANTA	RESISTENZA RUGGINE
FLORIANE	P	rosa chiaro	anemone	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
FLUCKY	P	rosso	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
MME NICOLE FALCE BLANC	P	bianco	semidoppio	rotonda	25 OTT	30 LUG	media	SI
MME NICOLE FALCE CUIVRE	P	arancio chiaro	semidoppio	rotonda	25 OTT	30 LUG	media	SI
MME NICOLE FALCE JAUNE	P	giallo limone	semidoppio	rotonda	25 OTT	30 LUG	media	SI
MME NICOLE FALCE ROSE	P	rosa chiaro	semidoppio	rotonda	25 OTT	30 LUG	media	SI
MME NICOLE FALCE ROUGE	P	rosso pastello	semidoppio	rotonda	25 OTT	30 LUG	media	SI
NEIGEUSE BLANC	P	bianco puro	doppio	piatta	20 OTT	10 AGO	media	SI
NEIGEUSE JAUNE	P	giallo intenso	doppio	piatta	20 OTT	10 AGO	media	SI

INFORMAZIONI TECNICHE-VARIETA' & COLORI

Fiore grande



MME NICOLE
FALCE BLANC ®



MME NICOLE
FALCE JAUNE ®



MME NICOLE
FALCE ROSE ®



MME NICOLE
FALCE ROUGE ®



MME NICOLE
FALCE CUIVRE ®




FLORIANE ®



NEIGEUSE
BLANC ®



NEIGEUSE
JAUNE ®



FLUCKY ®



Fiore medio



ELEPHANTINE®



ELEPHANTINE
BLANC®



ELEPHANTINE
APRICOT®



DANUSIA®



ELEPHANTINE
JAUNE®



ECRIN®



SHARADE®



DENDARA®



SOURIDOR®



GOUTTE
D'OR®



L'LOUDON®




LA BOIRE®

Fiore medio



EGLANTINE
JAUNE ©



VERDISSIMO ®



ANDALOU ©



LE GLAINE ©



LE GLAINE
JAUNE ©



ANDALOU
ROUGE ©



ROSANOVA ©



AVURA ©



NOCTURNE
ROUGE ©



L'ORTHE ©



FUTILE ©



Fiore medio



AVALON
CREAM®



AVALON
GOLDEN®



AVALON
YELLOW®



AVALON
SALMON®



AVALON
ORANGE®



AVALON
PINK®



AVALON
RED®



ETÈ INDIEN®



AVALON
PURPLE®



MONIQUE
ROUGE®



SYLVANE
ORANGE®



FRANCOISE
VIOLET®

Fiore medio



SELFIE
WHITE ®



SELFIE
YELLOW ®



SELFIE
SALMON ®



SELFIE
PINK ®



SELFIE
ORANGE ®



SELFIE
PURPLE ®



ALIANE
BLANC ®



SELFIE
RED ®



CHARISSE ®



VOILACTÉE ®



VOILACTÉE
JAUNE ®



L'ERVÈ ®



CRISANTEMI MULTIFLORA

Fiore medio



SPLENDIDE ©



MARELLE ©



CARESSE DES VELOURS ©

MULTIFLORA FIORE MEDIO

INFORMAZIONI TECNICHE-VARIETA' & COLORI

VARIETA'	BREVETTO	COLORE	TIPO DI FIORE	TIPO DI PIANTA	PERIODO FIORITURA	ULTIMA CIMATURA	DIMENSIONE PIANTA	RESISTENZA RUGGINE
ANDALOU	P	arancio	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
ANDALOU ROUGE	P	rosso	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
ALIANE BLANC	P	bianco	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
AVALON CREAM	P	bianco	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
AVALON GOLDEN	P	giallo oro	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
AVALON ORANGE	P	arancio	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
AVALON PINK	P	rosa	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
AVALON PURPLE	P	porpora	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
AVALON RED	P	rosso	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
AVALON SALMON	P	rosa salmone	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
AVALON YELLOW	P	giallo	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
AVURA	P	viola	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
BALCONET BLANC	P	bianco	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	si
BALCONET JAUNE	P	giallo	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	si
BALCONET ROSE	P	rosa	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	si
CARESSE DES VELOURS	P	rosso	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
CHARISSE	P	salmone	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	si
DANUSIA	P	rosa	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
DENDARA	P	giallo oro	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media-grande	si
ECRIN	P	bianco	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
EGLANTINE JAUNE	P	giallo	doppio	rotonda	30 OTT	10 AGO	media-grande	si
ELEPHANTINE	P	rosa salmone	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	si
ELEPHANTINE APRICOT	P	arancio	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	si
ELEPHANTINE BLANC	P	bianco	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	si
ELEPHANTINE JANUE	P	giallo	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	si
ETE' INDIEN	P	arancio	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
FRANCOISE VIOLET	P	porpora	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media-grande	si
FUTILE	P	viola	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
GOUTTE D'OR	P	giallo	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
LA BOIRIE	P	giallo intenso	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	si
LA VAIGES	P	lilla	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
LE GLAINE	P	bianco	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
LE GLAINE JAUNE	P	giallo	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
L'ERVE	P	rosso	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
L'ORTHE	P	rosa scuro	pom pon	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
L'ODON	P	arancio c.scuro	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	si
MARELLE	P	viola	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	si
MONIQUE ROUGE	P	rosso	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media-grande	si
NOCTURNE ROUGE	P	rosso	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
ROSANOVA	P	rosa	semidoppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
SELFIE ORANGE	P	arancio	doppio	rotonda	30 OTT	10 AGO	media	si
SELFIE PINK	P	rosa	doppio	rotonda	30 OTT	10 AGO	media	si
SELFIE PURPLE	P	porpora	doppio	rotonda	30 OTT	10 AGO	media	si
SELFIE RED	P	rosso	doppio	rotonda	30 OTT	10 AGO	media	si
SELFIE SALMON	P	rosa salmone	doppio	rotonda	30 OTT	10 AGO	media	si
SELFIE YELLOW	P	giallo	doppio	rotonda	30 OTT	10 AGO	media	si
SELFIE WHITE	P	bianco	doppio	rotonda	30 OTT	10 AGO	media	si
SHARADE	P	rosa salmone	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
SYLVIANE ORANGE	P	arancio	doppio	rotonda	30 OTT	10 AGO	media-grande	si
SPLENDIDE	P	rosso vivo	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
SOURIDOR	P	giallo	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	piccola	si
NEW VERDISSIMO	P	verde	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	si
VOILACTEE'	P	bianco	semidoppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	si
VOILACTEE' JAUNE	P	giallo	semidoppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	si

MULTIFLORA FIORE PICCOLO

INFORMAZIONI TECNICHE-VARIETA' & COLORI

VARIETA'	BREVETTO	COLORE	TIPO DI FIORE	FORMA PIANTA	PERIODO FIORITURA	ULTIMA CIMATURA	DIMENSIONE PIANTA	RESISTENZA RUGGINE
GAETA BIANCO		bianco crema	pom pon	rotonda	20 OTT	15 AGO	media	si
GAETA BRONZO		bronzo	pom pon	rotonda	20 OTT	15 AGO	media	si
GAETA GIALLO		giallo intenso	pom pon	rotonda	20 OTT	15 AGO	media	si
GAETA LILLA		lilla	pom pon	rotonda	20 OTT	15 AGO	media	si
GAETA ROSA		rosa chiaro	pom pon	rotonda	15 OTT	15 AGO	media	si
GAETA ROSSO		rosso vivo	pom pon	rotonda	20 OTT	15 AGO	media	si
PALIDORO GIALLO		g.oro c.giallo	margherita	rotonda	25 OTT	15 AGO	media-grande	si

CRISANTEMI MULTIFLORA

Fiore medio



BALCONET
BLANC ®



BALCONET
ROSE ®



BALCONET
JAUNE ®



LA VAIGES ®

CRISANTEMI MULTIFLORA

Fiore piccolo



GAETA
BIANCO ®



GAETA
ROSA ®



GAETA
GIALLO ®



GAETA
ROSSO ®



GAETA
BRONZO ®



GAETA
LILLA ®



PALIDORO
GIALLO ®



CRISANTEMI Settembrini



**BRANFOUNTAIN
WHITE** ®



**BRANFOUNTAIN
PINK** ®



**BRANFOUNTAIN
SALMON** ®



**BRANFOUNTAIN
YELLOW** ®



**BRANFOUNTAIN
LEMON** ®



**BRANFOUNTAIN
PURPLE** ®

MULTIFLORA FIORE PICCOLO

INFORMAZIONI TECNICHE-VARIETA' & COLORI

VARIETA'	BREVETTO	COLORE	TIPO DI FIORE	FORMA PIANTA	PERIODO FIORITURA	ULTIMA CIMATURA	DIMENSIONE PIANTA	RESISTENZA RUGGINE
BRANFOUNTAIN LEMON	P	giallo	medio-piccola	semidoppio/doppio rotonda	25-30 set	20-25 lug	media	SI
BRANFOUNTAIN PINK	P	rosa	medio-piccola	semidoppio/doppio rotonda	25-30 set	20-25 lug	media	SI
BRANFOUNTAIN PURPLE	P	viola	medio-piccola	semidoppio/doppio rotonda	25-30 set	20-25 lug	media	SI
BRANFOUNTAIN SALMON	P	salmon	medio-piccola	semidoppio/doppio rotonda	25-30 set	20-25 lug	media	SI
BRANFOUNTAIN YELLOW	P	giallo	medio-piccola	semidoppio/doppio rotonda	25-30 set	20-25 lug	media	SI
BRANFOUNTAIN WHITE	P	bianco	medio-piccola	semidoppio/doppio rotonda	25-30 set	20-25 lug	media	SI

Note culturali

PERIODO E TEMPO DI COLTIVAZIONE

Da Maggio a Ottobre, ciclo con 3 spuntature, vaso ø 18/20.

Da Giugno a Ottobre, ciclo con 2 spuntature, vaso ø 16/18.

Da Luglio a (sett. 27) a Ottobre, ciclo con una spuntatura, vaso ø 14/16.

È possibile fare vasi grandi anche partendo da Luglio (sett. 27), mettendo più talee esempio vaso ø 20 con tre talee da spuntare una sola volta dopo 8/10 giorni dall'invaso. Talee invasate prima del 10 Maggio necessitano di illuminazione foto periodica con 30 Watt/mq per 3 ore durante la notte e fino al 10 Maggio.

PREPARAZIONE

Pulire i bancali o le parcelle di coltivazione da ogni residuo di terra, sabbia e porzioni vegetali della precedente coltivazione.

Disinfettare con prodotto a base di sali di ammonio quaternari.

Le canne vanno successivamente pulite con acqua corrente per 10 minuti.

Attendere 2/3 giorni prima di posizionare i vasi.

COLTIVAZIONE

Utilizzare terriccio specifico, miscele di torba con argilla, concimato e corretto a pH 6-6,5. In presenza di acque dure utilizzare terriccio con pH 5,5-6.

Invasare con cura, evitando lesioni a foglie e radici, centrare bene la piantina nel vaso e tenere il colletto a filo terriccio.

Se possibile ombreggiare leggermente i vasi per i primi 15/20 giorni.

La spuntatura si esegue dopo circa 1/2 settimana dall'invasatura, lasciando 5/6 nodi sotto il punto di spuntatura. Le successive spuntature si eseguono lasciando sempre almeno 4/5 nodi sotto il punto di spuntature dei nuovi germogli.

Per i tipi "coreani" le spuntature si eseguono con forbice regolando la chioma.

Le indicazioni sulle spuntature, sopra riportate, sono indicative e vanno verificate, soprattutto come data dell'ultima spuntatura in funzione della varietà in coltivazione. Dopo 3/4 settimane dall'invasatura fertilizzare con complesso 20-10-20+ microelementi a 1,5 g/l sempre da due a tre volte alla settimana fino alla comparsa dei bottoni, passare quindi a complesso 15-10-25+ microelementi alla dose di 1,5 g/l sempre da due a tre volte alla settimana. Spaziare quando le foglie si toccano.

L'irrigazione dei vasi con impianto a goccia facilita le operazioni di bagnatura e fertilizzazione e riduce le bagnature sulla chioma. Per vasi ø 20, mettere almeno 2 gocciolatori per consentire la bagnatura completa e uniforme della zolla.

TEMPERATURA

Se necessario, proteggere in ottobre da eventuali gelate.

LUCE

Leggero ombreggio in estate se coltivate in serra, sarà necessario in questo caso arieggiare molto e aumentare gli interventi di brachizzazione.

FITOREGOLATORI

Per ottenere chiome compatte, oltre alla spuntatura, è necessario irrorare Alar 0,3%, un trattamento quando i nuovi germogli, dopo la spuntatura, sono lunghi 3-4 cm.

I trattamenti con Alar possono essere effettuati dopo ogni spuntatura e dopo l'ultima spuntatura ogni 15 giorni fino a quando i bottoni fiorali hanno raggiunto il ø di 5/6 mm.

Il numero di trattamenti da effettuare è comunque da definire in funzione della vigoria della varietà o dal tipo di prodotto che si vuole ottenere.

AVVERSITÀ

Marciume radicale (Pythium spp.). Marciume bruno delle radici che può estendersi sino al colletto. Le piante appassiscono e ingialliscono. Evitare eccessi di acqua nel substrato (drenaggio). Utilizzare Fosetyl aluminium, Propamocarb, Metalaxyl-M, Etridiazolo.

Si possono fare irrigazioni anche a base di fosfito di potassio. Marciumi del colletto e delle radici (Phytophthora cryptogea). Marciume scuro che interessa le radici, il colletto e la base del fusto. Le foglie si arrossano, ingialliscono ed avvizziscono. Evitare ristagni idrici.

Utilizzare Fosetyl-aluminium, Metalaxyl-M, Propamocarb, Etridiazolo. Marciume del colletto (Rhizoctonia solani). Lesione marrone e depressa alla base dello stelo, dapprima unilaterale e poi estesa all'intera circonferenza.

Utilizzare Iprodione, Tolclofos-metil, Cyprodonil+Fludioxonil, Thiram. Marciume dello stelo (Sclerotinia sclerotiorum). Aree di marciume umido marrone chiaro sulla parte basale dello stelo con successiva formazione miceliare bianca e cotonosa. La parte sovrastante della chioma avvizzisce e si dissecca. Utilizzare Iprodione, Procimidone, Thiophanate-metyle, Dichloran. Muffa Grigia (Botrytis cinerea). Piccole macchie brune sulle ligule dei fiori che si estendono fino ad interessare l'intero organo floreale. La malattia può interessare anche le foglie senescenti o lesionate. Sulle parti marcescenti sviluppa il tipico feltro di colore grigio.

Utilizzare Iprodione, Procimidone, Cyprodonil, Pirimetanil.

Mal bianco (Erisiphe cichoracearum).

Efflorescenza bianca su foglie, steli e boccioli.

Utilizzare Propiconazolo, Penconazolo, Miclobutanil, Esaconazolo, Bitertanolo, Dinocap. La malattia è favorita da eccessi di azoto.

Ascochitosi (Didymella chrysanthemi).

Marciume scuro e umido sui boccioli, piccole macchie rosate o nocciola, successivamente nerastre sulle ligule. La malattia può interessare le foglie e lo stelo, sulle foglie macchie di marciume scure che disseccano ma rimangono attaccate allo stelo. Utilizzare Bitertanolo.

Septoriosi (Septoria obesa).

Piccole macchie bronzate circolari, che si espandono lentamente e che diventano rossastre e neraste e assumono una forma irregolare.

L'infezione parte dalle foglie inferiori e si manifesta più frequentemente in tarda estate, inizio autunno. Spaziare bene le piante per favorire la ventilazione, trattamenti preventivi con Diathonon, Benzimidazolici, Thiram, Sali di rame.

Ruggine bianca (Puccinia oriana).

Piccole macchie di colore bianco verdastro sulla pagina superiore della foglie, in corrispondenza delle quali si sviluppano pustole di colore rosato o biancastro sulla pagina inferiore. Fine estate il periodo critico.

E' possibile trattare con Dithianon, Propineb (uso non registrato), Metiram, Mancozeb, Azoxytrobina.

Ruggine bruna (Puccinia chrysanthemi).

Macchie clorotiche e pustole brune su entrambe le pagine fogliari. Trattare come per la ruggine bianca.

Afidi. Acari. Tripidi.

Minatori Fogliari.

Piralide (Ostrinia nubilalis).

Noctue. Larve defogliatrici.