



ALBANI E RUGGIERI
YOUNG PLANTS, BREEDING & PRODUCTION

CRISANTEMI da vaso

ALBANI E RUGGIERI
YOUNG PLANTS, BREEDING & PRODUCTION
SOCIETÀ SEMPLICE AGRARIA

"Albani Vincenzo e Ruggieri Italiana" Società Semplice Agraria
Via Fontanatetta, 20 - Borgo Pantano S. Agostino - 00053 Civitavecchia (Roma) - Italy
Tel. +39.0766.568401 - Fax +39.0766.560351

www.albani.it - albani@albani.it

CRISANTEMI DA VASO

GUIDA AL CATALOGO **legenda**

LÉGENDE-LEGENDA-LEGEND

SETTIMANE DI REAZIONE

Settimane occorrenti per la fioritura dall'inizio dei giorni corti - REACTION WEEKS

Weeks needed for blooming starting from short-days - SEMAINES DE REACTION

Le nombre des semaines nécessaires pour la floraison à partir des jours courts - SEMANA DE REACCIÓN

Semana necesaria para la florescencia del inicio del día corto

CRESCITA/GROWING/CROISSANCE CRECIMIENTO:

1: BASSA-LOW-LENTE-BAJO

2: MEDIA-MEDIUM-MOYENNE-MEDIO

3: ALTA-HIGH-ÉLEVÉE-ALTO

INDICE

- 2/5** UNIFLORA
FIORE A PALLA
- 6** MARGHERITE BICOLOR
- 7** MULTIFLORA
FIORE GRANDE
- 8/13** MULTIFLORA
FIORE MEDIO
- 13** MULTIFLORA
FIORE PICCOLO
- 14** SETTEMBRINI
INFO &
NOTE COLTURALI



ALBUGO®

TARQUINIA
BIANCO

TARQUINIA GIALLO



TOLERANCE BLANC®



TOLERANCE JAUNE®



PASSION JAUNE®



LADY VALOR®

LE COLOMBIER
JAUNE®

CRISANTEMI UNIFLORA **FIORE A PALLA**



ARBER®



ANGELEYS®



**ANGELEYS
JAUNE**®



FAIBELLE®



DIANA WHITE®



DIANA BRONZE®



DIANA PINK®



DIANA ORANGE®

CRISANTEMI UNIFLORA **FIORE A PALLA**



BELLATIA[®]



BILKIS[®]



ROMY[®]



ROMY
BORDEAUX[®]



SPERLONGA




OLEBO[®]



TOLFA



VITERBO



CHAMA
ROUGE




CHAMA
VIOLET[®]



FRASCATI
ROSA

CRISANTEMI UNIFLORA **FIORE A PALLA**



ALLUMIERE



LE COLOMBIER DORE'



LE COLOMBIER ROUGE



CHAMA GIALLO



TRESCHAUD



KANZOU



GUEPIER



BENEDICTE ROUGE



KARINE
JAUNE
BLANC
ROSE
CUIVRE



CRISANTEMI MARGHERITE BICOLOR



CHARLESTON ROUGE®



CHARLESTON ROSE®

MARGHERITE BICOLOR

Informazioni Tecniche-Varietà & Colori

VARIETÀ	BREVETTO	COLORE	TIPO DI FIORE	FORMA PIANTA	PERIODO FIORITURA	ULTIMA CIMATURA	DIMENSIONE PIANTA	ALAR	RESISTENZA ALLA RUGGINE
CHARLESTON ROSE	P	bicolore rosa	semplice	eretta	20 OTT	10 AGO	grande	SI	SI
CHARLESTON ROUGE	P	bicolore rosso	semplice	eretta	20 OTT	10 AGO	grande	SI	SI

UNIFLORA FIORE A PALLA

Informazioni Tecniche-Varietà & Colori

VARIETÀ	BREVETTO	COLORE	TIPO DI PIANTA	PERIODO FIORITURA	ULTIMA CIMATURA	ALAR	RESISTENZA ALLA RUGGINE
ANGELEYS	P	bianco	media	15 OTT	30 LUG	NO	SI
ANGELEYS JAUNE	P	giallo chiaro	media	15 OTT	30 LUG	NO	SI
ALBUGO	P	bianco puro	media	30 OTT	15-20 LUG	NO	NO
ALLUMIERE	-	bronzo	media	20 OTT	20-30 LUG	SI	NO
NEW ARBER	P	bianco	media	20 OTT	30 LUG	SI	SI
BELLATIA	P	giallo	media	25 OTT	20 LUG	SI	NO
BENEDICTE ROUGE	P	rosso bronzo	media	25 OTT	20-30 LUG	SI	SI
BILKIS	P	bianco	medio-alta	25 OTT	20-30 LUG	SI	SI
CHAMA GIALLO	P	giallo intenso	medio-bassa	25 OTT	20-30 LUG	NO	NO
CHAMA ROUGE	P	rosso	medio-bassa	25 OTT	20-30 LUG	NO	NO
CHAMA VIOLET	P	viola	medio-bassa	25 OTT	20-30 LUG	NO	NO
DIANA BRONZE	P	bronzo	media	15 OTT	30 LUG	NO	SI
DIANA ORANGE	P	arancio	media	15 OTT	30 LUG	NO	SI
DIANA PINK	P	rosa	media	15 OTT	30 LUG	NO	SI
DIANA WHITE	P	bianco	media	15 OTT	30 LUG	NO	SI
FAIBELLE	P	rosa	media	20 OTT	30 LUG	SI	SI
FRASCATI ROSA	-	rosa chiaro	media	20 OTT	20-30 LUG	SI	NO
GUEPIER	P	giallo intenso	medio-alta	30 OTT	15-20 LUG	SI	NO
KANZOU	P	rosa	medio	20 OTT	30 LUG	SI	NO
KARINE BLANC	P	bianco	medio-bassa	20 OTT	20-30 LUG	SI	SI
KARINE CUIVRE	P	bronzo	medio-bassa	20 OTT	20-30 LUG	SI	SI
KARINE JAUNE	P	giallo	medio-bassa	20 OTT	20-30 LUG	SI	SI
KARINE ROSE	P	rosa	medio-bassa	20 OTT	20-30 LUG	SI	SI
LADY VALOR	P	giallo	medio-bassa	15 OTT	20 LUG	NO	NO
LE COLOMBIER DORÉ	P	bronzo intenso	medio-alta	20 OTT	20-30 LUG	SI	NO
LE COLOMBIER JAUNE	P	giallo	medio-alta	20 OTT	20-30 LUG	SI	NO
LE COLOMBIER ROUGE	P	rosso	medio-alta	20 OTT	20-30 LUG	SI	NO
OLEBO	P	lilla	media	20 OTT	30 LUG	SI	SI
PASSION JAUNE	P	giallo carico	medio-alta	25 OTT	20 LUG	SI	NO
ROMY	P	lilla scuro	media	20 OTT	20-30 LUG	NO	SI
ROMY BORDEAUX	P	rosso	media	20 OTT	20-30 LUG	NO	SI
SPERLONGA	-	rosso	medio-bassa	25 OTT	20-30 LUG	NO	NO
TARQUINIA BIANCO	-	bianco puro	medio-alta	20 OTT	20-30 LUG	SI	SI
TARQUINIA GIALLO	-	giallo oro	medio-alta	20 OTT	20-30 LUG	SI	SI
TOLERANCE BLANC	P	bianco puro	media	20 OTT	15-20 LUG	SI	SI
TOLERANCE JAUNE	P	giallo oro	media	20 OTT	15-20 LUG	SI	SI
TOLFA	-	rosso	medio-alta	20 OTT	20 LUG	SI	SI
TRESCHAUD	P	arancio	medio-bassa	20 OTT	20-30 LUG	SI	NO
VITERBO	-	lilla intenso	medio-alta	25 OTT	20-30 LUG	SI	NO


MULTIFLORA FIORE GRANDE

Informazioni Tecniche-Varietà & Colori


VARIETÀ	BREVETTO	COLORE	TIPO DI FIORE	FORMA PIANTA	PERIODO FIORITURA	ULTIMA CIMATURA	DIMENSIONE PIANTA	RESISTENZA ALLA RUGGINE
FLORIANE	P	rosa chiaro	anemone	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
FLUCKY	P	rosso	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
MME NICOLE FALCE BLANC	P	bianco	semidoppio	rotonda	25 OTT	30 LUG	media	SI
MME NICOLE FALCE CUIVRE	P	arancio chiaro	semidoppio	rotonda	25 OTT	30 LUG	media	SI
MME NICOLE FALCE JAUNE	P	giallo limone	semidoppio	rotonda	25 OTT	30 LUG	media	SI
MME NICOLE FALCE ROSE	P	rosa chiaro	semidoppio	rotonda	25 OTT	30 LUG	media	SI
MME NICOLE FALCE ROUGE	P	rosso pastello	semidoppio	rotonda	25 OTT	30 LUG	media	SI
NEIGEUSE BLANC	P	bianco puro	doppio	piatta	20 OTT	10 AGO	media	SI
NEIGEUSE JAUNE	P	giallo intenso	doppio	piatta	20 OTT	10 AGO	media	SI



CRISANTEMI MULTIFLORA **FIORE GRANDE**



**MME NICOLE
FALCE BLANC**®



**MME NICOLE
FALCE ROSE**®



**MME NICOLE
FALCE JAUNE**®




FLORIANE®



**MME NICOLE
FALCE ROUGE**®



**MME NICOLE
FALCE CUIVRE**®



FLUCKY®



NEIGEUSE BLANC®



NEIGEUSE JAUNE®

CRISANTEMI MULTIFLORA **FIORE MEDIO**



DANUSIA[®]



ELEPHANTINE
BLANC[®]



ELEPHANTINE[®]



ECRIN[®]



ELEPHANTINE
APRICOT[®]



ELEPHANTINE
JAUNE[®]



SHARADE




DENDARA[®]



SOURIDOR[®]



GOUTTE D'OR[®]



L'LOUDON[®]




LA BOIRE[®]

CRISANTEMI MULTIFLORA **FIORE MEDIO**



VOILACTÉE®



VOILACTÉE
JAUNE®



LE GLAINE®



LE GLAINE
JAUNE®



ETE' INDIEN®



EGLANTINE
JAUNE®



LA VAIGES®



L'ERVE®



ROSANOVA®



L'ORTHE®



FUTILE®

CRISANTEMI MULTIFLORA **FIORE MEDIO**




AVALON CREAM®




AVALON YELLOW®



AVALON GOLDEN®




AVALON PURPLE®



AVALON SALMON®



AVALON PINK®



AVALON RED®



SYLVIANE
ORANGE®



AVALON ORANGE®



MONIQUE
ROUGE®



FRANCOISE
VIOLET®

CRISANTEMI MULTIFLORA **FIORE MEDIO**



**SELFIE
WHITE**



**SELFIE
YELLOW**



**SELFIE
ORANGE**



**SELFIE
PURPLE**



**SELFIE
RED**



**SELFIE
PINK**



**SELFIE
SALMON**



**ALIANE
BLANC**



CHARISSE



CRISANTEMI MULTIFLORA FIORE MEDIO



MULTIFLORA FIORE MEDIO

Informazioni Tecniche-Varietà & Colori

	BREVETTO	COLORE	TIPO DI FIORE	FORMA PIANTA	PERIODO FIORITURA	ULTIMA CIMATURA	DIMENSIONE PIANTA	RESISTENZA ALLA RUGGINE
ALIANE BLANC	P	bianco	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
AVALON CREAM	P	bianco	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
AVALON GOLDEN	P	giallo oro	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
AVALON ORANGE	P	arancio	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
AVALON PINK	P	rosa	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
AVALON PURPLE	P	porpora	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
AVALON RED	P	rosso	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
AVALON SALMON	P	rosa salmone	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
AVALON YELLOW	P	giallo	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
BALCONET BLANC	P	bianco	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	SI
BALCONET JAUNE	P	giallo	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	SI
BALCONET ROSE	P	rosa	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	SI
CARESSE DES VELOURS	P	rosso	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
CHARISSE	P	salmone	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	SI
DANUSIA	P	rosa	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
DENDARA	P	giallo oro	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media-grande	SI
ECRIN	P	bianco	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
EGLANTINE JAUNE	P	giallo	doppio	rotonda	30 OTT	10 AGO	media-grande	SI
ELEPHANTINE	P	rosa salmone	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	SI
ELEPHANTINE APRICOT	P	arancio	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	SI
ELEPHANTINE BLANC	P	bianco	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	SI
ELEPHANTINE JAUNE	P	giallo	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	SI
ETE' INDIEN	P	arancio	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
FRANCOISE VIOLET	P	porpora	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media-grande	SI
FUTILE	P	viola	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
GOUTTE D' OR	P	giallo	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
LA BOIRIE	P	giallo intenso	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	SI
LA VAIGES	P	lilla	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
LE GLAINE	P	bianco	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
LE GLAINE JAUNE	P	giallo	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
L'ERVE	P	rosso	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
L'ORTHE	P	rosa scuro	pom pon	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
L'UDON	P	arancio c. scuro	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	SI
MARELLE	P	viola	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	SI
MONIQUE ROUGE	P	rosso	doppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media-grande	SI
ROSANOVA	P	rosa	semidoppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
SELFIE ORANGE	P	arancio	doppio	rotonda	30 OTT	10 AGO	media	SI
SELFIE PINK	P	rosa	doppio	rotonda	30 OTT	10 AGO	media	SI
SELFIE PURPLE	P	porpora	doppio	rotonda	30 OTT	10 AGO	media	SI
SELFIE RED	P	rosso	doppio	rotonda	30 OTT	10 AGO	media	SI
SELFIE SALMON	P	rosa salmone	doppio	rotonda	30 OTT	10 AGO	media	SI
SELFIE YELLOW	P	giallo	doppio	rotonda	30 OTT	10 AGO	media	SI
SELFIE WHITE	P	bianco	doppio	rotonda	30 OTT	10 AGO	media	SI
SHARADE	P	rosa salmone	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
SYLVIANE ORANGE	P	arancio	doppio	rotonda	30 OTT	10 AGO	media-grande	SI
SPLENDE	P	rosso vivo	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	media	SI
SOURIDOR	P	giallo	doppio	rotonda	20 OTT	10 AGO	piccola	SI
VOILACTEE	P	bianco	semidoppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	SI
VOILACTEE JAUNE	P	giallo	semidoppio	rotonda	25 OTT	10 AGO	media	SI

MULTIFLORA FIORE PICCOLO

Informazioni Tecniche-Varietà & Colori

VARIETA'	BREVETTO	COLORE	TIPO DI FIORE	FORMA PIANTA	PERIODO FIORITURA	ULTIMA CIMATURA	DIMENSIONE PIANTA	RESISTENZA ALLA RUGGINE
GAETA BIANCO	-	bianco crema	pom pon	rotonda	20 OTT	15 AGO	media	SI
GAETA BRONZO	-	bronzo	pom pon	rotonda	20 OTT	15 AGO	media	SI
GAETA GIALLO	-	giallo intenso	pom pon	rotonda	20 OTT	15 AGO	media	SI
GAETA LILLA	-	lilla	pom pon	rotonda	20 OTT	15 AGO	media	SI
GAETA ROSA	-	rosa chiaro	pom pon	rotonda	15 OTT	15 AGO	media	SI
GAETA ROSSO	-	rosso vivo	pom pon	rotonda	20 OTT	15 AGO	media	SI
PALIDORO GIALLO	-	g.oro c. giallo	margherita	rotonda	25 OTT	15 AGO	media-grande	SI



CRISANTEMI MULTIFLORA **FIORE MEDIO**




**BALCONET
JAUNE**



**BALCONET
BLANC**



**BALCONET
ROSE**



GAETA LILLA

CRISANTEMI MULTIFLORA **FIORE PICCOLO**



GAETA GIALLO



GAETA ROSA



GAETA BIANCO



**PALIDORO
GIALLO**



GAETA ROSSO



GAETA BRONZO

CRISANTEMI SETTEMBRINI

BRANFOUNTAIN®
pinkBRANFOUNTAIN®
yellowBRANFOUNTAIN®
lemonBRANFOUNTAIN®
whiteBRANFOUNTAIN®
salmonBRANFOUNTAIN®
purple

SETTEMBRINI

Informazioni Tecniche-Varietà & Colori

VARIETÀ	BREVETTO	COLORE	GRANDEZZA FIORE	TIPO DI FIORE	FORMA PIANTA	PERIODO FIORITURA	ULTIMA CIMATURA	DIMENSIONE PIANTA	RESISTENZA ALLA RUGGINE
BRANFOUNTAIN LEMON	P	giallo	medio-piccola	semidoppio/doppio	rotonda	25-30 set	20-25 lug	media	SI
BRANFOUNTAIN PINK	P	rosa	medio-piccola	semidoppio/doppio	rotonda	25-30 set	20-25 lug	media	SI
BRANFOUNTAIN PURPLE	P	viola	medio-piccola	semidoppio/doppio	rotonda	25-30 set	20-25 lug	media	SI
BRANFOUNTAIN SALMON	P	salmone	medio-piccola	semidoppio/doppio	rotonda	25-30 set	20-25 lug	media	SI
BRANFOUNTAIN YELLOW	P	giallo	medio-piccola	semidoppio/doppio	rotonda	25-30 set	20-25 lug	media	SI
BRANFOUNTAIN WHITE	P	bianco	medio-piccola	semidoppio/doppio	rotonda	25-30 set	20-25 lug	media	SI

Note culturali

PERIODO E TEMPO DI COLTIVAZIONE

Da Maggio a Ottobre, ciclo con 3 spuntare, vaso ø 18/20.

Da Giugno a Ottobre, ciclo con 2 spuntature, vaso ø 16/18.

Da Luglio a (sett. 27) a Ottobre, ciclo con una spuntatura, vaso ø 14/16.

È possibile fare vasi grandi anche partendo da Luglio (sett. 27), mettendo più talee esempio vaso ø 20 con tre talee da spuntare una sola volta dopo 8/10 giorni dall'invaso. Talee invase prima del 10 Maggio necessitano di illuminazione foto periodica con 30 Watt/mq per 3 ore durante la notte e fino al 10 Maggio.

PREPARAZIONE

Pulire i bancali o le parcelle di coltivazione da ogni residuo di terra, sabbia e porzioni vegetali della precedente coltivazione.

Disinfettare con prodotto a base di sali di ammonio quaternari.

Le canne vanno successivamente pulite con acqua corrente per 10 minuti.

Attendere 2/3 giorni prima di posizionare i vasi.

COLTIVAZIONE

Utilizzare terriccio specifico, miscele di torba con argilla, concimato e corretto a pH 6-6,5. In presenza di acque dure utilizzare terriccio con pH 5,5-6.

Invasare con cura, evitando lesioni a foglie e radici, centrare bene la piantina nel vaso e tenere il colletto a filo terriccio.

Se possibile ombreggiare leggermente i vasi per i primi 15/20 giorni.

La spuntatura si esegue dopo circa 1/2 settimana dall'invasatura, lasciando 5/6 nodi sotto il punto di spuntatura. Le successive spuntature si eseguono lasciando sempre almeno 4/5 nodi sotto il punto di spuntatura dei nuovi germogli.

Per i tipi "coreani" le spuntature si eseguono con forbice regolando la chioma.

Le indicazioni sulle spuntature, sopra riportate, sono indicative e vanno verificate, soprattutto come data dell'ultima spuntatura in funzione della varietà in coltivazione. Dopo 3/4 settimane dall'invasatura fertilizzare con complesso 20-10-20+ microelementi a 1,5 g/l sempre da due a tre volte alla settimana fino alla comparsa dei bottoni, passare quindi a complesso 15-10-25+ microelementi alla dose di 1,5 g/l sempre da due a tre volte alla settimana. Spaziare quando le foglie si toccano.

L'irrigazione dei vasi con impianto a goccia facilita le operazioni di bagnatura e fertilizzazione e riduce le bagnature sulla chioma. Per vasi ø 20, mettere almeno 2 gocciolatori per consentire la bagnatura completa e uniforme della zolla.

TEMPERATURA

Se necessario, proteggere in ottobre da eventuali gelate.

LUCE

Leggero ombreggio in estate se coltivate in serra, sarà necessario in questo caso arieggiare molto e aumentare gli interventi di brachizzazione.

FITOREGOLATORI

Per ottenere chiome compatte, oltre alla spuntature, è necessario irrorare Alar 0,3%, un trattamento quando i nuovi germogli, dopo la spuntatura, sono lunghi 3-4 cm.

I trattamenti con Alar possono essere effettuati dopo ogni spuntatura e dopo l'ultima spuntatura ogni 15 giorni fino a quando i bottoni floreali hanno raggiunto il ø di 5/6 mm.

Il numero di trattamenti da effettuare è comunque da definire in funzione della vigoria della varietà o dal tipo di prodotto che si vuole ottenere.

AWERSITÀ

Marciume radicale (Pythium spp.). Marciume bruno delle radici che può estendersi sino al colletto. Le piante appassiscono e ingialliscono. Evitare eccessi di acqua nel substrato (drenaggio). Utilizzare Fosetyl aluminium, Propamocarb, Metalaxyl-M, Etridiazolo.

Si possono fare irrigazioni anche a base di fosfito di potassio. Marciumi del colletto e delle radici (Phytophthora cryptogea). Marciume scuro che interessa le radici, il colletto e la base del fusto. Le foglie si arrossano, ingialliscono ed avvizziscono. Evitare ristagni idrici.

Utilizzare Fosetyl-aluminium, Metalaxyl-M, Propamocarb, Etridiazolo. Marciume del colletto (Rhizoctonia solani). Lesione marrone e depressa alla base dello stelo, dapprima unilaterale e poi estesa all'intera circonferenza.

Utilizzare Iprodione, Toldofos-metile, Cyprodonil+Fludioxonil, Thiram. Marciume dello stelo (Sclerotinia sclerotiorum). Aree di marciume umido marrone chiaro sulla parte basale dello stelo con successiva formazione miceliare bianca e cotonosa. La parte sovrastante della chioma avvizzisce e si dissecca. Utilizzare Iprodione, Procimidone, Thiophanate-metyle, Dichloran. Muffa Grigia (Botrytis cinerea). Piccole macchie brune sulle ligule dei fiori che si estendono fino ad interessare l'intero organo florale. La malattia può interessare anche le foglie senescenti o lesionate. Sulle parti marcescenti sviluppa il tipico feltro di colore grigio.

Utilizzare Iprodione, Procimidone, Cyprodonil, Pirimetanil.

Mal bianco (Erisiphe cichoracearum).

Efflorescenza bianca su foglie, steli e boccioli.

Utilizzare Propiconazolo, Penconazolo, Midobutanil, Esaconazolo, Bitertanolo, Dinocap. La malattia è favorita da eccessi di azoto.

Ascochitosi (Didymella chrysanthemi).

Marciume scuro e umido sui boccioli, piccole macchie rosate o nocciola, successivamente nerastre sulle ligule. La malattia può interessare le foglie e lo stelo, sulle foglie macchie di marciume scure che disseccano ma rimangono attaccate allo stelo. Utilizzare Bitertanolo.

Septoriosi (Septoria obesa).

Piccole macchie bronzate circolari, che si espandono lentamente e che diventano rossastre e nerastre e assumono una forma irregolare.

L'infezione parte dalle foglie inferiori e si manifesta più frequentemente in tarda estate, inizio autunno. Spaziare bene le piante per favorire la ventilazione, trattamenti preventivi con Diathonon, Benzimidazolici, Thiram, Sali di rame.

Ruggine bianca (Puccinia oriana).

Piccole macchie di colore bianco verdastro sulla pagina superiore della foglie, in corrispondenza delle quali si sviluppano pustole di colore rosato o biancastro sulla pagina inferiore. Fine estate il periodo critico.

È possibile trattare con Dithianon, Propineb (uso non registrato), Metiram, Mancozeb, Azoxystrobina.

Ruggine bruna (Puccinia chrysanthemi).

Macchie clorotiche e pustole brune su entrambe le pagine fogliari. Trattare come per la ruggine bianca.

Afici. Acari. Tripidi.

Minatori Fogliari.

Piralide (Ostrinia nubilalis).

Nottue. Larve defogliatrici.